



## Wildpflanzen-Arten, die im Vortrag "Gestaltung mit heimischen Wildpflanzen – mehr Natur für Insekten und Menschen" genannt und gezeigt werden.

Art deutsch	Art botanisch	Blütezeit	Blütenfarbe	Höhe	Besonderheit	Vortragsfolie	Boden	Herkunft
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	VI - IX	weiß	40-100	2-jährig	1	normal	Mitteleuropa
Bibernell-Rose	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	VI	weiß	100 - 150	Mit schöner Herbstfärbung. Die ungefüllten, leicht duftenden Blüten verwandeln sich dann zu Hagebutten.	3	nährstoffreich, basisch	Mitteleuropa
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	VII - VIII	zartrosa	150 - 200	Die Blütenstände der zweijährigen Pflanze können bis zum folgenden Frühjahr stehen gelassen werden.	5	anspruchlos	Mitteleuropa
Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	VII - IX	leuchtendrosa	80 - 180	Die Blütenstände können bis in das folgende Frühjahr stehen gelassen werden.	5	anspruchlos bis feucht	Mitteleuropa
Gewöhnlicher Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>	VII - VIII	zartrosa	50 - 150		6	frisch, feucht	Mitteleuropa
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	VII - VIII	gelb	80 - 200	In milden Lagen winterhart	7	durchlässig, nicht zu trocken	Südeuropa
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	V - VIII	blauviolett	50		8	durchlässig, trocken	Mitteleuropa
Wald Engelwurz	<i>Angelica sylvestris</i>	VI - IX	weiß	50 bis 150	Doldenblüter	8	frisch	Mitteleuropa
gelbes Buschwindröschen	<i>Anemone ranunculoides</i>	IV - V	goldgelb	15	zieht nach der Blüte ein	11	frisch, feucht	Mitteleuropa
Mauretanische Malve	<i>Malva mauritania</i>	VI - IX	purpurviolett	100 - 140	In milden Lagen winterhart. Essbar.	11	durchlässig	Mitteleuropa
Gewöhnlicher Diptam	<i>Dictamnus albus</i>	VI - VII	rosa	80 - 100	Die Blütenstände können bis in das folgende Frühjahr stehen gelassen werden.	11	durchlässig	Mitteleuropa
geflecktes Lungenkraut	<i>Pullmonaria officinalis</i>	III - V	rosa - blau	15	wintergrüne Blätter, die rote Blütenfarbe wechselt nach der Befruchtung zu blau.	12	frisch	Mitteleuropa
Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>	V - VI	violettblau	bis 70		12	frisch	Mitteleuropa
Steppen-Salbei	<i>Salvia nemorosa</i> 'Mainacht'	V - IX	violett	60	Bewährte früh und dunkel blühende Sorte	13	trocken	Sorte heimischer Pflanze
Magerwiesen Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	V - IX	weiss	30-60		14	anspruchlos	Mitteleuropa
Kleines Seifenkraut	<i>Saponaria ocymoides</i>	V - VII	purpurrosa	10 bis 20		14	durchlässig	Mittel- und Südeuropa
Wimpern - Perlgras	<i>Melica ciliata</i>	V - VI	weiß	30 bis 60	Walzenförmige Rispen bis in den Herbst ziehend.	15	trocken	Mitteleuropa
Weidenblättriges Ochsenauge	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	VI - IX	gelb	40		15	anspruchlos	Mitteleuropa
Karhausemelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>	VI - IX	kräftig rosa	20 - 45		15	durchlässig	Mitteleuropa
Sonnenröschen	<i>Helianthemum nummularium</i>	VI - IX	gelb	15	Wintergrünes Blatt	16	durchlässig	Mitteleuropa
Taubenkropf - Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	VI - VIII	weiß	bis 30		16	durchlässig, trocken	Mitteleuropa
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	VI - IX	hellblau	100 - 120	Diese 2-jährige Staude erhält sich im Beet durch Aussaat	16	durchlässig	Mitteleuropa
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	VI - XI	blau violett	30-90		16	anspruchlos, trocken	Mitteleuropa
Wiesenknöterich	<i>Bistorta officinalis</i>	V - VIII	rosa	bis 60		17	frisch	Mitteleuropa
Echte Schlüsselblume	<i>Primula veris</i>	III - IV	schwefelgelb	20		17	frisch	Mitteleuropa
Gewöhnlicher Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	V - VI	gelb	10-30		18	trocken	Mitteleuropa
Katzenminze	<i>Nepeta x faassenii</i>	V - X	violettblau	40-50	Blätter duften. Kippt oder hängt mit der Zeit. Verträgt Rückschnitt sehr gut, blüht dann nach.	18	durchlässig, trocken	Hybride aus <i>N.racemosa</i> x <i>N.nepetella</i>
Gelber Fingerhut	<i>Digitalis lutea</i>	VI - VII	hellgelb	60 - 100	zweijährig	18	frisch	West-, Südeuropa

Gefördert im

Gefördert durch

